

AGENOTAX

NALOXONA



**NO NECESITA
RECETA MÉDICA
DE CONTROLADOS^{2,3}**


Medicamento Fracción IV

AGENOTAX

Revierde los efectos de sobredosis por opioides evitando la depresión respiratoria y mortalidad.¹

3 Signos de intoxicación

- Pupilas puntiformes
- Depresión Respiratoria
- Pérdida de conciencia



AGENOTAX

Naloxona

SOLUCIÓN
0.4 mg/mL
INYECTABLE

Vía de administración:
Intravenosa e intramuscular

Caja con 10 ampolletas con 1 mL cada una e instructivo anexo

**CLAVE:
040.000.0302.00**

No. REGISTRO: 159M2024 SSA IV

Natural
Medic
Quim.

FOLIO INTERNO: AGENO_FLYERMX042025

AVISO COFEPRIS 2521062002C00008



Dosificación AGENOTAX

Sospecha o diagnóstico de intoxicación por opioides



ADULTO

Inicial 0.4 - 2 mg IV

Repetir cada 2-3 minutos hasta obtener respuesta - máximo 10 mg

Alternativa: Dosis IM 0.4 - 2 mg inicial
Inicio más lento pero más prolongado.

Mantenimiento

Infusión continua 1-5 μ g / kg / hora



NIÑOS

Inicial 0.01 mg / kg IV
(alternativa aplicar IM)

Si no hay respuesta \rightarrow 0.1 mg / kg

En dosis posteriores
puede requerir infusión continua
1-5 μ g / kg / hora



NEONATOS

Con madre bajo efecto opiáceo
0.01 mg / kg / IV,

Repetir cada 2 - 3 min

Para perfusión IV; Naloxona 0.4 mg/mL se diluye con cloruro de sodio 0.9 % o con glucosa 5%



No. REGISTRO: 159M2024 SSA IV

Clorhidrato Naloxona
Ampolleta con 0.4 mg/mL

Clave 040.000.0302.00



PARA MAYOR
INFORMACIÓN
**CONSULTE
IPPR
DIGITAL**

1. IPPR_AGENOTAX_2025

2. Secretaría de Salud, Diario Oficial de la Federación, Ley General de Salud, 07 de junio de 2024.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf

3. FDA. (2023). Access to Naloxone Can Save a Life During an Opioid Overdose. FDA.

<https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/access-naloxone-can-save-life-during-opioid-overdose>